

UNE VARIÉTÉ NOUVELLE DU POLYGONUM SENEGALENSE MEISN.

Par A. CAVACO.

Polygonum senegalense Meisn. var. **robustum** Cavaco var. nov. — *Folia*, 20-30 cm. longa, 5 1/2 — 7 cm. lata, nervis basi patentibus; *pedunculus inflorescentiae* \pm 4 cm. longus; *inflorescentia* 5 — 9 1/2 cm. longa.

C'est une herbe vivace à tige robuste, dressée, glabre; à feuilles oblongues — lancéolées, acuminées, distinctement pétiolées, glabres sauf sur la nervure médiane et les bords qui sont pourvus de soies, garnies de ponctuations noires, longues de 20-30 cm., larges de 5 1/2-7 cm., à nervures presque perpendiculaires à la nervure médiane; ochréas glabres. Epis moyennement robustes, longs de 5-9 1/2 cm., à pédoneule long de \pm 4 cm.; bractées glabres; étamines \pm 6; styles 2; fruit à faces concaves, orbiculaire, luisant, noire.

Dans les terrains marécageux.

MADAGASCAR : Nossy-Be, *Boivin s. n.*

COMORES : Mayotte, *Boivin* 3130.

SEYCHELLES : *Pervillé* 54; *Boivin s. n.*

Endémique.

Laboratoire de Phanérogamie du Muséum.